

MYKOFENOLÁT MOFETIL

(Cellcept[®])

Mykofenolát mofetil (MMF) působí tím, že brání množení lymfocytů (bílých krvinek). Používá se vždy v kombinaci s dalšími imunosupresivními léky, jako je cyklosporin nebo tacrolimus. Ne všichni pacienti užívají MMF, takže nemějte obavy, pokud tento lék není součástí vašeho režimu imunosupresivní léčby.

Užívání MMF

- Celková dávka léku se má rozdělit do dvou denních dávek a užívat ve 12hodinových intervalech.
- Vyndejte tobolku z blistru a ihned ji zapijte větším množstvím vody.
- Doporučuje se, abyste užívali MMF nalačno, nejmeně jednu hodinu před jídlem nebo 2-3 hodiny po jídle.

Vedlejší účinky

Buňky kostní dřeně se rychle dělí a jsou velmi citlivé na účinky MMF. Pacienti, kteří užívali MMF, mohou mít snížený počet bílých krvinek a krevních destiček, a proto zvýšenou náchylnost k infekcím. Někteří pacienti mohou mít pocity na zvracení a často se objevuje průjem. Těmto vedlejším účinkům lze snížením

dávky obvykle zabránit nebo je alespoň snížit.

Upozornění

V případě, že je žena těhotná nebo kojící, musí být zváženy výhody z užívání tohoto léku před jeho možným vlivem na ženu, její nenarozené dítě či kojence. Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantční tým.

