

## AZATHIOPRIN (Imuran®)

Azathioprin působí tak, že zasahuje do schopnosti buněk se dělit. Používá se vždy v kombinaci s dalšími imunosupresivními léky, jako je cyklosporin nebo

tacrolimus. V kombinaci lze podávat nižší dávky ostatních léků. Azathioprin představuje užitečnou alternativu, pokud je nutná kombinace imunosupresivních léků. Ne všichni pacienti po transplantaci užívají azathioprin, takže se nezneklidňujte, pokud tento lék není součástí vašeho režimu imunosupresivní léčby.



### *Užívání azathioprinu*

- Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti, zdravotního stavu a doby od provedení transplantace.
- Tablety můžete užívat v kteroukoliv denní dobu. Snažte se však dodržovat každý den stejnou dobu.

### *Vedlejší účinky*

Buňky kostní dřeně se rychle dělí a jsou velmi citlivé na účinky azathioprinu. Pacienti, kteří užívají azathioprin, mohou mít snížený počet bílých krvinek a tím zvýšenou náchylnost k infekcím. Mohou mít i chudokrevnost (anemii). Je proto nezbytné, aby váš lékař prováděl pravidelné vyšetření krevního obrazu. Pokud zjistí snížený počet bílých krvinek, budete muset přestat tento lék užívat, aby kostní dřeň měla čas se zotavit.

Kromě toho se může při užívání azathioprinu vyskytovat:

- padání vlasů
- horečka
- bolesti kloubů
- poruchy funkce jater
- zvýšené riziko tvorby nádorů (lymfomů)

I když tento seznam může vypadat hrozivě, je důležité připomenout, že frekvence zmíněných vedlejších účinků je relativně malá. Účinky azathioprinu na kostní dřeň jsou dočasné, pokud se lék vysadí. Azathioprin se užívá k prevenci rejekce již více než 35 let. U většiny lidí je v nízkých dávkách potřebných k prevenci rejekce bezpečný.

### *Upozornění*

V případě, že je žena těhotná nebo kojící, musí být zváženy výhody z užívání tohoto léku před jeho možným vlivem na ženu, její nenarozené dítě či kojence. Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantaci tým.

