

SIROLIMUS (Rapamune®)

Sirolimus, stejně jako cyklosporin a tacrolimus, blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na vaši novou ledvinu. Sirolimus se obvykle užívá



v kombinaci s kortikosteroidy, event. i jinými imunosupresivními léky. Koncentraci sirolimu kolujícího ve vaší krvi lze změřit vyšetřením krve a získané výsledky se používají k rozhodování, kdy a jak dávky v případě potřeby upravit.

Užívání sirolimu (tablet)

- Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti, hladin léku v krvi, zdravotního stavu, výsledků laboratorních vyšetření a přítomnosti vedlejších účinků.
- Sirolimus se obvykle užívá v jedné denní dávce. Zapijte jej větším množstvím vody.
- V případě, že užíváte také cyklosporin, musíte oba léky užívat s odstupem přibližně 4 hodin.

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky sirolimu jsou tyto:

- snížený počet červených krvinek a krevních destiček
- bolesti břicha, průjem
- zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krvi
- bolesti kloubů
- akné
- infekce močových cest
- otoky končetin

Většina těchto nežádoucích účinků ustoupí nebo se zmírní po snížení dávky léku. Pamatujte, že je nepravděpodobné, že se u vás vyskytnou všechny nebo většina vedlejších účinků. Jakmile bude postupem času dávka léku snížena, pravděpodobně budete mít i méně vedlejších účinků.



POZNÁMKA

V prvních měsících užívání sirolimu vám budou prováděny běžné krevní zkoušky k sledování účinnosti léčby a vedlejších účinků.

Upozornění

Sirolimus reaguje vzájemně s některými často používanými léky. Před použitím jakéhokoliv nového léku se vždy poraďte se svým lékařem nebo transplantačním týmem. To se týká i volně prodejných léků, které si můžete zakoupit v lékárně.

V případě, že je žena těhotná nebo kojící, musí být zváženy výhody z užívání tohoto léku před jeho možným vlivem na ženu, její nenarozené dítě či kojence. Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantační tým.