

SIROLIMUS (Rapamune)

Sirolimus, stejně jako tacrolimus a cyklosporin, blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na Vaše nové srdce. Obvykle se užívá v kombinaci s kortikosteroidy i dalšími imunosupresivy zejména tam, kde je obava z poškození ledvin tacrolimem nebo cyklosporinem. Jeho dávkování se rovněž řídí stanovením jeho koncentrace ve Vaší krvi. Sirolimus se užívá v jedné denní dávce a zapíjí se větším množstvím tekutiny. V případě, že současně užíváte tacrolimus a cyklosporin, musíte sirolimus užít s odstupem přibližně 4 hodin.

Vedlejší účinky

Níže je uveden všeobecný přehled nejčastějších vedlejších účinků imunosupresivních léků, které byste měli znát. Tyto informace nezahrnují všechny vedlejší účinky. Pokud máte další otázky, poraďte se svým lékařem nebo transplantačním týmem. Pamatujte, že u většiny lidí se nevyskytují všechny vedlejší účinky uvedené v příbalové informaci a s postupným snižováním dávek léků Vaším lékařem se bude prav-

děpodobně vyskytovat stále méně vedlejších účinků.
Mezi vedlejší účinky základních imunosupresivních léků, které byste měli znát, patří:

- třes rukou (tremor)
- hypertenze
- bolesti hlavy
- zažívací potíže, např. průjem, zvracení, nucení na zvracení, vředy
- brnění (parestezie)
- nadměrný růst vlasů či ochlupení nebo padání vlasů
- porucha vidění
- zbytnění (hyperplazie) dásní
- cushingoidní vzhled (otylé tváře, kulatá záda)
- ztenčení kůže, akné
- zadržování vody