

## TACROLIMUS (Prograf®)

Tacrolimus, stejně jako cyklosporin, blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na vaši novou ledvinu. Tacrolimus se obvykle užívá v kombinaci

buď s azathioprinem, nebo mykofenolát mofetilem a s kortikosteroidy. Několik dní po operaci však můžete dostávat nitrožilně tacrolimus samotný. Koncentraci tacrolimu kolujícího ve vaší krvi lze změřit vyšetřením krve a získané výsledky se používají k rozhodování, kdy a jak dávky v případě potřeby upravit.



### POZNÁMKA

**V prvních měsících užívání tacrolimu vám budou prováděny běžné krevní zkoušky k sledování účinnosti léčby a vedlejších účinků.**

### *Užívání tacrolimu (tobolek)*

- Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti, hladin léku v krvi, zdravotního stavu, výsledků laboratorních vyšetření a přítomnosti vedlejších účinků.

- Celková denní dávka tacrolimu se rozdělí na dvě a užívá se po 12 hodinách. Vyndejte tobolky z blistru a ihned je spolkněte. Zapijte je větším množstvím vody.
- Tobolky užívejte nejméně jednu hodinu před jídlem nebo 2–3 hodiny po jídle.
- V den své kontrolní návštěvy u lékaře si neberte tacrolimus do doby odběru krve. Nezapomeňte si vzít lék s sebou, abyste si ho mohli vzít ihned po odběru krve na vyšetření.

### *Vedlejší účinky*

Vedlejší účinky tacrolimu jsou tyto:

- poruchy funkce ledvin
- vysoký krevní tlak
- poruchy spánku
- vyšší hladiny cukru v krvi, event. cukrovka
- snížená citlivost a brnění rukou a nohou
- třes rukou zvaný tremor
- zažívací obtíže jako průjem, zvracení, nucení na zvracení
- zvýšená hladina cholesterolu
- bolesti hlavy



Většina těchto nežádoucích účinků ustoupí nebo se zmírní po snížení dávky léku. Pamatujte, že je nepravděpodobné, že se u vás vyskytnou všechny nebo většina vedlejších účinků. Jakmile bude postupem času dávka léku snížena, pravděpodobně budete mít i méně vedlejších účinků.

### *Upozornění*

- tacrolimus reaguje vzájemně s některými často používanými léky. Před použitím jakéhokoliv nového léku se vždy poraďte se svým lékařem nebo transplantačním týmem. To se týká i volně prodejných léků, které si můžete zakoupit v lékárně
- v případě, že je žena těhotná nebo kojící, musí být zváženy výhody z užívání tohoto léku před jeho možným vlivem na ženu, její nenarozené dítě či kojenče. Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantační tým



### **DŮLEŽITÉ!**

**Transplantační tým se může rozhodnout převést vás z tacrolimu na cyklosporin nebo opačně vzhledem k výskytu rejekce nebo nepříjemných vedlejších účinků. Pokud je změněn váš léčebný režim, je důležité, abyste dodržovali pokyny lékaře. Nikdy nesmíte užívat ve stejnou dobu tacrolimus a cyklosporin.**